

會員委聘衛生局轉院醫務

張如先

•

蠅子產生於不清潔之處，尤其是馬房馬糞堆上，廁所糞便上以及不潔之極敗食物上。要進行防蠅運動，諸種時應立即着手進行：（1）馬房每日要馬兵打掃，將糞除之馬糞者推行環倒，此外，要將糞堆上築一層土蓋起以免產生蠅子。

（2）將住厩附近路旁，不必之廁所一律填埋了，可將糞挖新廁所（廁所口要小些），每日要將廁所上搭些石灰，並禁止亂解大小便。

（3）伙房之剩菜剩飯一定要用布或冷布蓋起。

（4）厩房院內不要喂豬，同時要需用灰土掩蓋豬圈內的糞物。

(5) 伙房潑水及剩下的飯菜，湯水不要亂倒。
(6) 室內不要亂放亂掉的東西。
二、大家一致擁護蒼蠅：
(1) 機關學校團體要組織的進行捕蠅運動，發動每個同志，每日在休息時間要打蠅子或規定其打的數目。尤其是現在更要加緊去打，現在打死一個等於將來打死幾十萬萬個，因此要求大家，見蠅子馬上要打。

(2) 用以下的方法毒死蛇子。

A. 將錫紙用松脂七分大蘇油三分砂麝少量，混合於紙上或用松香十二分大蘇油九分豬油一分以上三種混合，放鍋上加熱溶化為止然後塗紙上即可。

B. 混雜藥：川砒礬三分砂麝八分，混合用水少許放鍋內，蛇子吃了就死。

以上是防蛇滅蛇的簡單辦法，希望大家注意防止疾病傳染，保障身體健康！

燕•
鄴•

我首先談一談關於陝北老嫗給女坐月子的（臨盆）一貫情形，據有經驗的婆姨說，當婆姨臨坐月子時的前後，均坐在土堆或灰堆上，（均三天之下）等待將生臨，然後調接生婆來接生，而地不管三七十一，單憑兩隻手硬幹來，小孩下生時她用力外拖，不管會產破與否，也不根據任何的理學理，若為順生者還好，遇到難產而產婦痛苦等

治。

此外最不好的地方（也是死亡最大的原因），即是當小孩已生下時，接生婆用不乾淨的剪子剪斷臍帶，並用沒有經水煮過或日光曬過布條，棉花，包圍布，裹襁褓容易使小孩發生其他傳染病，而致死亡，又遇產婦出血（大出血）時，則用土或灰堵塞子宮，陰道以達止血之目的，

因以上幾種情形而死亡的產婦，也不知有多少。

至關於產後的休息，養嬰兒之處理根本談不到，當嬰兒生小孩後仍臥在土堆上或草堆上達三天之久，並有鬼神之說；若睡下即可發生問題，至於營養，完全給點米湯吃，對於小兒也不給洗澡，四川做布包裹住。這樣，對產婦和小兒都是有很大損害的。

我們根據以上幾

因此，我們根據各種現象擬以下列改良方法：

(一) 產婦分娩時應臥的位置，以仰臥位（面朝天睡覺）而兩腿伸直便於生產後擦生，（在臀部下墊一些乾淨棉花，但勿過熱及點不可墊土以導傳染）（抽筋病）。

(二)接生者應幫助產婦，產婦最難過時應很平安，當小兒的頭快要露出時，接生者應舉陰戶之兩側，以免陰戚裂，若頭露出時應該用一手拖頭，慢慢向外拉，絕不可過

猛。並且事先應很好把毛洗乾淨。

(三)剪鬚帶所用的剃刀子、布條、棉花，最好每用後煮過半小時，再剪，然後用煮過布條、棉花，還要弄乾的去包裝。若產後大出血時，可用乾淨棉花（青蠟的）塗水填塞至陰

成起鰲有面活滿，兒看我

得破傷風（抽搦）。

（四）着會陰時，可用煮過的鹽雞之，然後用棉花（乾淨）浸鹽水（滾熱的）將會陰部及其周圍拭淨後用八寸長三寸寬布帶（乾淨）經水煮過或日光晒過後包裹住。

（五）對出生之小兒用乾淨棉花，浸以開過的溫水給小兒洗澡，（應生拭其粘液物），最後穿上

一個有經驗的母親，她們很能夠到她的乳兒營養狀態，生長得豐，紅潤，滋潤，美麗，可愛，這無可變，這經驗的母親，而使同類的乳兒發，瘦，發

乳兒的營養好壞，對一個人的終生健康的基礎有極其重大的意義，而日爲母知曉的，如果了解了乳兒的營養方法，在實地處理乳

小兒怎樣

小兒的生理需要，但是有許多小兒在生下後因為種種的原因沒有奶吃了，這時就必須要用和母乳相當的東西代替，這種營養就是人工營養。

(六)產婦生產後第一
——三日應很好靜臥，供
飲食如米湯、麵湯、雞蛋
雞湯紅糖吃。只吃米湯最
不鈣營養的，最低限度，
吃一點雞蛋。第七日可以
坐起，給米飯（米粥）麵
飯等，萬勿吃乾食——最
心應休息二十一天才可，
千萬不可以很早起床即刻
做事。

營養的時候，也減少了許多意料外的憂慮。

乳兒營養的分類是有好種的，如天然營養法（食母乳），人工營養法（食牛乳，小羊乳，粉乳等）及混合營養法（天然營養法和人工營養法混合用）。

以上增三種方法，前一種（天然營養）最適宜，而且初生兒其最理想的營養也莫過於食母乳，

介紹於次：
當窺小兒一落地不久久的時候，便啼哭起來，在這種時候他便有吃奶的本能，從此開始直至離乳期止，這一個過程，普通叫做哺期，哺乳期的長短，通常為六——七個月的樣子，如果在生後哺乳期延長了

人工營養

中所含的成份與母乳無異，百分之五）而糖要生乳比人的倍數（即如水的白含最較多）則須依小兒的乳脂含量較少而酌定。

營養不良的現象，體重增加的停止是顯著的事實，這就証實了兒童的健康，不合乎衛生的。而且當着乳兒生齒的時候，我們就應當漸漸實行離乳的（斷奶）。但斷奶並不是想斷一下就可以斷了的，普通約需兩個月的時間才能夠達到完全的離乳。

至於乳兒在哺乳期中，不注意哺乳的時間和每次

所應有的量，也往往超過於消化不良，開胃的狀態，因此了解母乳對於乳兒的消化性質，時間及授乳量是必要的，母乳在乳兒的胃內通常停留一——二小時才完全被消化而消失的，那麼每一次的授乳間隔時間，不應過短，否則會增加小孩的胃不息的扭負，會引起消化不良的，而應當隔三——四小時一次，較為適宜，也是合乎

於生理衛生的，但在夜間則以八小時授乳一次為適宜。茲將每日授乳時間列下：

上上六時一次，十時一次，下午二時一次，六時一次，深夜十時一次，一日夜二十四小時共授乳五次，是適合於乳兒營養要

只加服
乳
與次
同。

四——六月小兒
 其法宜
 米湯
 一份（二分之一乳
 毛病時
 澆粉酌
 半乳二份加水
 一份（三分之一乳
 水一
 六月以後的小兒
 二

頁時

五·一二，這個偉大的節日就很快的到來，每年這一天，全世界每一個角落的護士人們都很隆重紀念著這個大自己的節日，述和研究近代護士鼻祖南丁格爾氏平生史

五一二，是南氏的生日，南氏少年性情和，富有同情心，好幫助人，以貴族家女公子出身，終身為護士界工作到底，改了過去許多護理工作上缺點，奠定了近代病事業的基礎，工作中雖多次受家裡的驅逐離家工作，但她始終未動搖，在倫敦多馬醫院設立世界近代第一個護士學校，使護士專業愈趨向前發展，直至南氏逝世止，還是忠於她自己的職務。因此護士學會決定了五月十二號為世界護士節。

今年五一二，正當猶太世界法西斯集團瘋狂的時候，他們毀滅了世界和平，殘害了數人民的生命，我們紀念五一二，應該本南丁格爾工作的精神，為人類幸福和昌盛救治世界上一切被法西斯野獸損害了健康人們，使法西斯集團潰滅，全人類和平繁

記如下：

月齡哺乳量（西四）一月
星期五十四，二月一百一十
西四，三月一百三十四西
四月，三月一百三十四西，五
六月以後一百五十——一百
六十四西，以上每一次的
乳量是根據乳兒的營養
要求，以準確的計算推定
是不可動的，只好以乳兒
吸奶的時間來推定，普通
每次吸奶十五——二十分
鐘，每次吸奶一個，這樣
在每次吸奶的時候，可以
交替的更換乳房。

（作者：「西四」是秤
量四歲時應用的每三百西
西約等於普通的三號茶缸
子的容量。）

甲、衣，在不妨礙初生兒的發育及運動，穿衣不要過多和過少，以大柔軟溫暖為宜。
2、經常保持其尿布被褥衣服的乾燥清潔，並且不使其生皺紋。
3、初生兒每週至少要洗澡一次至二次，洗澡水不要過冷過熱。
乙、食，小兒出世十二小時後，因餓而啼哭，如母乳未下來，可喂以乳開水。最好不吃即的奶，以免發生意嘔吐、肚瀉。
丙、夜間每隔四—五小時吃一次。
丁、大便，衣服被褥及運動，穿衣不要過多和過少，以大柔軟溫暖為宜。
戊、力弱，容易生病，病了，暫時應給以流質食物。
己、常有大人將硬東西嚼碎吐於小兒口內，這種方法，更是危險怕人，因容易氣湧通，光機將其其他病傳給小兒，這和小兒接觸（疳積）是一樣的危險。
庚、6、小兒哭時注意的就處：隱察察是否因為小兒半親戚餓了，然後再決定門子，不帶着給其吃。因為小兒看病人。哭不光是因為餓。

丙、住，室溫不宜太冷，清潔。

另有兩點注意的就處：
X X

事，又，夠保，但在，天冰，有些

請醫生看）可將乳汁擠於小兒口內。
3、小兒剛吃完奶，要保持其安靜，勿動身體，不然會發生逆乳（吐奶）
4、吃奶要規定時間，健康小兒可每隔三小時吃一次，
